

SHENJA URGJENTE TË PARALAJMËRIMIT TË NËNAVE



Dhimbje koke
që nuk ikën ose
përkeqësohet me
kalimin e kohës



Marramendje
ose të fikët



Mendime për
të dëmtuar
vetveten ose
foshnjën tuaj




Ndryshime në
shikimin tuaj



Temperaturë



Vështirësi në
frymëmarrje



Dhimbje në
kraharor ose
rrahje të shpejta
të zemrës



Dhimbje e rëndë në
bark që nuk ikën




Të përziera të rënda
ose të vjella (jo si
sëmundja e mëngjesit)



Lëvizjet e foshnjës
ndalojnë ose
ngadalësohen



Rrjedhje gjaku nga
vagina ose rrjedhje
lëngu pas shtatzënisë



Rrjedhje gjaku
nga vagina ose
rrjedhje lëngu
pas shtatzënisë



Ënjtje, skuqje
ose dhimbje
e këmbës tuaj



Ënjtje ekstreme
e duarve ose
fytirës tuaj



Lodhje dërmuese

Nëse keni ndonjë nga këto simptoma gjatë ose pas shtatzënisë, kontaktoni ofruesin e shërbimit tuaj shëndetësor dhe merrni ndihmë menjëherë.

Nëse nuk mund të kontaktoni ofruesin e shërbimit tuaj, shkoni te urgjenca. Mbani mend të thoni se jeni shtatzënë ose keni qënë shtatzënë brenda vitit të kaluar.

Mësoni më shumë: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



Bëni një
fotografi për
të mësuar
më shumë

© 2022 Kolegji Amerikan i Obstetërve dhe Ginekologëve. Jepet leje këtui për dublikimin dhe shpërndarjen e këtij dokumenti, të plotë dhe pa modifikim, vetëm për veprimtari jo-tregtare që janë për qëllime edukative, të përmirësimit të cilësisë dhe sigurisë së pacientit. Të gjitha përdorimet e tjera kërkojnë leje me shkrim nga ACOG.