

母体の緊急警告サイン



いつまでも続く頭痛、または時間の経過とともに悪化する頭痛



めまいや失神



自分や赤ちゃんを傷つけてしまいくる




視力の変化



発熱



呼吸困難



胸痛または心拍が速い



いつまでも続く重度の腹痛




重度の吐き気および嘔吐(つわりとは異なる場合)



赤ちゃんの動きが止まる、または遅くなる



妊娠中の膣出血または体液漏れ



出産後の膣出血または体液漏れ



脚の腫れ、赤み、痛み



手や顔の著しい腫れ



激しい疲労感

妊娠中または妊娠後にこれらの症状が現れた場合は、すぐにかかりつけの医療機関に連絡し、助言を受けてください。

かかりつけの医療機関と連絡が取れない場合は、救急外来を受診してください。あなたが現在妊娠している、または過去1年以内に妊娠していたことを必ず伝えてください。

詳しくはこちらをご覧ください：<https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



詳細はQRコードからご確認ください。

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. 本書は、教育、質の向上、および患者の安全を目的とした非営利活動に限り、本書全体を変更することなく複製および配布することを許可します。その他すべての使用には、ACOGの書面による許可が必要です。