


तत्काल-मातृक-पूर्वसूचना-चिह्नानि



शिरोवेदना, या समीचीना
न भवति उत कालान्तरे
अधिका पीडादायिका भवति



शिरोभ्रमणं
मूर्च्छा वा



स्वाम् उत शिशुम्
आहतं कर्तुं विचाराः




भवत्याः दृष्टौ
परिवर्तनं भवति



ज्वरः



श्वसने कष्टम्



वक्षःस्थलवेदना उत
द्रुतस्पन्दनहृदयम्



तीव्रोदरवेदना या न गच्छति




गंभीरवमथुः उत वमनम्
(प्रातः रोगिष्ठमनोवत् न)



शिशोः गतिः स्थगिता
अथवा मन्दा भवति



योनिरक्तस्रावः अथवा द्रवस्य
स्रवणम् गर्भधारणकाले



योनिरक्तस्रावः अथवा द्रवस्य
स्रवणम् गर्भधारणकालोत्तरम्



पादस्य शोफः,
रक्तता उत वेदना



भवत्याः हस्तयोः मुखस्य
वा अत्यन्तं शोफः



अभिभूता श्रान्तता

यदि भवत्याः गर्भावस्थायां उत ततः परं एतादृशेषु लक्षणेषु कश्चन अपि लक्षणः अस्ति,
तर्हि स्वस्वास्थ्यसेवाप्रदातृणां सम्पर्कं कृत्वा तत्क्षणमेव सहायतां प्राप्नुतु।

यदि भवती स्वस्य प्रदातुः सम्पर्कं कर्तुं न शक्नुवन्ति तर्हि आपत्कालीन-कक्षं गच्छतु।
अविस्मृत्य कथयतु यत् भवती गर्भवती अस्ति उत एकवर्षाभ्यान्तरे गर्भं धृतवती अस्ति इति।

अधिकं जानातु: <https://saferbirth.org/aim-resources/aim-cornerstones/urgent-maternal-warning-signs/>



अधिकं ज्ञातुं
चित्रं गृह्यताम्

© 2022 American College of Obstetricians and Gynecologists. अनुमतिः अस्ति - एतेन अस्य प्रलेखस्य द्वितीयकीकरणाय वितरणाय च, सम्पूर्णतया एवञ्च परिवर्तनं विना, केवलं अव्यावसायिकक्रियाकलापानां कृते प्रदत्ता या शैक्षिकस्य, गुणवत्तापरिष्कारस्य, रोगिसुरक्षायाः च कृते विद्यते। अन्येषां सर्वेषां प्रयोगाणां कृते ACOG इत्यस्मात् लिखितानुमतिः आवश्यकी भवति।